

Royalny

Synonyme Bezeichnungen: 1923-6

Herkunft: HBLA und BA Klosterneuburg

Abstammung: ZW x Festivalny

Verbreitung in Österreich: einige
Versuchsflächen

Ampelographische Merkmale:

Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache

Anthozyanfärbung, mittelstark wollig behaart,

keine Borsten, halb aufrechte Triebhaltung

Internodien: dorsal: grün mit roten Streifen,

ventral: grün mit roten Streifen

Knospenschuppen: über die Hälfte mit mittlerer

bis starker Anthozyanfärbung; diskontinuierliche

Verteilung der mittellangen Ranken

Junges Blatt - Oberseite: bronzierte Blattfläche

Junges Blatt - Unterseite: mittelstarke Wollbehaarung zwischen den Nerven, keine Borsten



Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig mit fünf Lappen und ein ebenes Profil, Hauptnerven auf der Blat-

toberseite ohne Anthozyanfärbung, die Spreite ist sehr schwach gewaffelt und schwach blasig,

Blattzähne sind abwechselnd beiderseits geradlinig bzw. beiderseits rundgewölbt, Stielbucht wenig

offen mit U-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, Zähne in der Stielbucht und in den oberen

Seitenbuchten fehlen, Blattunterseite mittelstarke Behaarung, schwache Beborstung der Haupt-

nerven



Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: mittellang (bis 7 cm)

Traube: ist kurz (12 cm), mitteldicht, Grundform ist zylindrisch mit drei bis vier Flügeln, Beirtraube selten bis nicht vorhanden,

Beere: Form ist abgestumpft eiförmig, Länge ist mittel (bis 18 mm), Breite ist mittel (bis 18 mm), Einzelbeeregewicht ist gering (2 g), Beerenhaut ist schwarz- blau, mitteldick, kein Farbstoff im Fruchtfleisch, saftiges Fruchtfleisch, neutraler Geschmack, Samen vollständig ausgebildet



Phänologie:

Austrieb	mittel
Blütezeit	mittel
Reifezeit	mittelspät
Winterfrost-Resistenz	sehr gut
Frühjahrsfrost-Regeneration	unbekannt
Plasmopara-Toleranz	sehr gut
Oidium-Toleranz	sehr gut
Botrytis-Toleranz	gut
Platzneigung	gering

Agrarische Eigenschaften:

benötigt gute Lagen und karge Böden, mittlere Fruchtbarkeit erfordert wenig Reduktionsarbeit, ertragssicher

Qualitätsprofil der Weine:

Aroma nach Sauerkirsche und dunklen Beeren, gehaltvoll, liegt zwischen ZW und BF Aroma

Züchterische Bearbeitung:

noch kein Klon verfügbar

